

گذاشتن و کشیدن کاتر دبل جی

کلیاتی در مورد کاتر دبل جی :

گذاشتن کاتر دبل جی در بیمارانی با مشکلات کلیوی استفاده می شود . بعضی مواقع برای بیماران اورژانسی جنبه حیاتی دارد و او را از یک عمل دیالیز یا پیوند کلیه یا یک عمل وسیع نجات میدهد .

هدف از گذاشتن لوله دبل جی :

به طور کلی هدف از گذاشتن لوله دبل جی ، باز نگه داشتن راه مجرای و برطرف کردن انسداد است .

گذاشتن و کشیدن لوله دبل جی چگونه

انجام می شود ؟

این عمل اکثرا به صورت اورژانسی یا سرپایی انجام می شود .

بدین صورت که با تزریق کردن بی حسی در مجاری ادرار ، بوسیله دستگاهی به نام سیستوسکوپ لوله دبل جی وارد حالب شده و به

سمت کلیه هدایت میشود و بدین ترتیب یک سر آن داخل لگنچه کلیه و سر دیگر آن در داخل مثانه قرار می گیرد تا با گشاد نگه داشتن راه حالب انسداد را برطرف کند . برای خارج کردن کاتر دبل جی نیز با تزریق کردن بی حسی در مجاری ادرار ، بوسیله سیستوسکوپ کاتر دبل جی را خارج می کنند.

پس در گذاشتن و کشیدن لوله دبل جی ، جایی از بدن باز یا برشی داده نمی شود . فقط از راه مجرای اداری لوله دبل جی گذاشته می شود و از همین طریق برداشته می شود .

مراجعه بعدی و مدت نگه داشتن دبل جی در

بدن :

مراجعه بعدی و مدت نگه داشتن لوله دبل جی در بدن بستگی به نوع عملی دارد که بر روی شما بیمار گرامی انجام گرفته است که از ۲ تا ۶ هفته متغیر می باشد . شما بیمار محترم پس از گذاشتن لوله دبل جی ، در اتاق

عمل یا در بخش مربوطه ، برگه ای به شما داده می شود که می توانید با مطالعه آن جهت خارج کردن لوله دبل جی به پزشک معالج خودتان در تاریخ تعیین شده مراجعه نمایید .

دستورات دارویی : اگر شما بیمار گرامی بعد از گذاشتن کاتر دبل جی عفونت یا تب دارید آنتی بیوتیک به شما داده می شود . همچنین برای درد ، داروی مسکنی داده می شود که با گشاد کردن راه مجاری و مثانه درد شما را کمتر کند .

پس به طور کلی بعد از گذاشتن دبل جی و در زمان کشیدن دبل جی معمولا بیماران به آنتی بیوتیک نیاز دارند که نوع و میزان آن بستگی به پزشک مربوطه دارد.

تغذیه یا رژیم غذایی : در مورد لوله دبل جی رژیم غذایی خاصی ندارد اما کسانی که کلیه سنگ ساز دارند ، بر اساس نوع و جنس سنگ



به نام خدا

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهریار

گذاشتن ویرون آوردن

لوله دبل جی

تهیه کننده: محمد حسن عرفایی

(کارشناس پرستاری)


تایید کننده: دکتر نادر ابدالخانی

(متخصص کلیه و مجاری ادراری)

منابع: داخلی و جراحی برونر

کد: EU-PA-09/02

بازنگری: شهریور ۹۹



دارند ممکن است باعث خونریزی ناحیه عمل شود .

عوارض یا مشکلات بعد از عمل :

عوارضی که بعد از گذاشتن کاتتر دبل جی برای شما بیمار گرمی پیش می آید عبارتند از : سوزش (مخصوصا در انتهای ادرار کردن و خالی شدن مثانه) ، تکرر ادرار ، ناراحتی در مثانه ، خارش خون در ادرار ، درد در ناحیه پهلو (مخصوصا در حین ادرار کردن) این عوارض بعد از کشیدن لوله دبل جی برطرف خواهند شد.

ممکن است توسط پزشک معالج در رژیم غذایی خاصی داده شود .

فولی یا کیسه ادراری :

شما بیمار محترم بر اساس نوع عملی که می شوید ممکن است فولی (کیسه ادراری) داشته باشید . فولی را روی تخت قرار ندهید بلکه آویزان کنید .

استحمام : صرفا داشتن کاتتر دبل جی در بدن مانعی برای حمام کردن نیست .

ورزش و فعالیت های جسمی و جنسی :

ورزش و فعالیت های شما بیمار محترم باز بستگی به نوع عملی که شده اید دارد . اگر هدف از گذاشتن دبل جی برای رفع انسدادی است که داشته اید می توانید فعالیت روزمره خود را داشته باشید ولی به طور کلی بهتر است فعالیت شدید بدنی و ورزش های سنگین انجام ندهید . فعالیت جنسی در بیمارانی که عمل سنگ کلیه انجام داده اند لوله دبل جی